

## VII. Kontaktpersonennachverfolgung

[https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges\\_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik\\_Kontakt\\_allg.pdf?\\_\\_blob=publicationFile](https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik_Kontakt_allg.pdf?__blob=publicationFile)

Stand: 10.09.2021

ROBERT KOCH INSTITUT



# Kontaktpersonennachverfolgung bei SARS-CoV-2-Infektionen



### Ermittlung von Kontaktpersonen bei bestätigtem COVID-19-Fall

- ▶ Symptomatischer Fall: Ab 2 Tage vor Auftreten erster Symptome bis 14 Tage nach Symptombeginn
- ▶ Asymptomatischer Fall: Ab 2 Tage vor Test bis 14 Tage nach Test

### Definition enger Kontaktpersonen

- ▶ Aufenthalt im Nahfeld (< 1,5 m Abstand) > 10 min ohne adäquaten Schutz
- ▶ Gespräch (< 1,5 m Abstand) ohne adäquaten Schutz unabhängig von Dauer oder direkter Kontakt mit respiratorischem Sekret
- ▶ Aufenthalt im selben Raum mit wahrscheinlich hoher Konzentration infektiöser Aerosole für > 10 min

Hinweis: Für adäquaten Schutz tragen Fall- und Kontaktperson durchgehend und korrekt Mund-Nasen-Schutz oder FFP2-Maske. Bei geschultem medizinischem Personal reicht es, wenn dieses eine FFP2-Maske korrekt trägt.



### Gesundheitsamt

- ▶ Ermittlung, namentliche Registrierung
- ▶ Rückwärts- und Vorwärtsermittlung
- ▶ Priorisierung von Situationen mit hohem Übertragungspotential, Situationen mit Beteiligung von Personen mit erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf sowie bei Verdacht auf neu aufgetretene besorgniserregende Varianten (VOC)
- ▶ Information über Krankheit und Übertragung
- ▶ De-Priorisierung von Situation mit geringem Übertragungsrisiko, z. B. Situationen mit gut implementierter präventiver Multikomponentenstrategie, große Veranstaltungen mit umgesetztem Hygienekonzept und hohem Anteil an Geimpften/ Genesenen, bei Flügen < 5h



### Enge Kontaktperson

- ▶ Quarantäne-Optionen
  1. Häusliche Quarantäne für 10 Tage
  2. Häusliche Quarantäne für 5 Tage und abschließenden negativem PCR-Nachweis, Probenentnahme frühestens an Tag 5; Für Personen, die in eine serielle Teststrategie eingebunden sind (z. B. SchülerInnen), ggf. auch mittels qualitativ hochwertiger Antigen-Schnelltests
  3. Häusliche Quarantäne für 7 Tage und abschließenden negativem Antigen-Schnelltest mit Probenentnahme frühestens an Tag 7

Keine Quarantäne erforderlich für vollständig Geimpfte und Genesene
- ▶ Gesundheitsüberwachung
  - Täglich Messung der Körpertemperatur und Symptomtagebuch bis zum 14. Tag nach der letzten Exposition
- ▶ Testung
  - Wird zum Beginn der Quarantäne ein Test durchgeführt, dann möglichst mittels PCR-Nachweis
  - Bei symptomatischen Personen



### Maßnahmen bei Auftreten von Symptomen

- ▶ Sofortiger Kontakt zu Gesundheitsamt und Testung mittels PCR-Test
- ▶ Isolierung gemäß Vorgaben des Gesundheitsamts
- ▶ Kontaktpersonen ab 2 Tage vor Symptombeginn notieren



Weitere Informationen  
[www.rki.de/covid-19](http://www.rki.de/covid-19)



Kontaktpersonenmanagement  
[www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen](http://www.rki.de/covid-19-kontaktpersonen)



Maßnahmen in medizinischen  
und pflegerischen Einrichtungen  
[www.rki.de/covid-19-patientenversorgung](http://www.rki.de/covid-19-patientenversorgung)